

表三

苗圃產品出售前紅火蟻防治施藥紀錄表

| 施藥日期 <sup>2</sup> | 產品名稱      | 數量         | 藥劑名稱 | 有效成分含量及劑型      | 稀釋倍數或施用藥量        | 施藥方式 <sup>3</sup> | 施藥人員簽名 |
|-------------------|-----------|------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|
| 105 年○月<br>○日     | 聖誕紅<br>盆栽 | 1,000<br>盆 | 賽洛寧  | 2.46%膠<br>囊懸著劑 | 稀釋<br>1,000<br>倍 | 澆灌                | 王○○    |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |
|                   |           |            |      |                |                  |                   |        |

備註：

1. 本表由苗圃業者自行填寫，並留存備查。
2. 藥劑劑型如為膠囊懸著劑型，水懸劑或可濕性粉劑，應於產品出售前 7 日內施藥；如為粒劑劑型，則應於產品出售前 14 日內施藥。
3. 若以澆灌方式施藥，澆灌之藥液量應達花盆（或栽培介質）體積 20%以上；如以粒劑混拌介質之方式施藥，應使藥劑之有效成分佔栽培介質之 0.001 至 0.0025%。