

第三條附表五 成品農藥安定試驗標準規格

規格項目	適用範圍	檢驗方法	標準規格
耐熱試驗	1.賜諾殺 0.02%濃餌劑及 0.015%餌劑	加速貯藏試驗法 (CIPAC MT 46.3), 於 54 ± 2 °C 放置 14 日。	有效成分含量不低於未處理樣品之 80%。
	2.馬拉松之粉劑類 (粉劑及可溼性粉劑) 成品農藥。 3.克枯爛及其混合成品農藥。 4.40%滅大松水溶性袋裝可濕性粉劑。	加速貯藏試驗法 (CIPAC MT 46.3), 於 54 ± 2 °C 放置 14 日。	有效成分含量不低於未處理樣品之 85%。
	5.免速隆及其混合成品農藥。 6. 2.57%丁拉百速隆混合粒劑。 7.大滅松之乳劑類 (乳劑、水基乳劑及微乳劑) 成品農藥。 8.馬拉松之乳劑類 (乳劑、水基乳劑及微乳劑) 成品農藥。 9.18.4%賽福芬胺混合水分散粒劑中之賽福座。	加速貯藏試驗法 (CIPAC MT 46.3), 於 54 ± 2 °C 放置 14 日。	有效成分含量不低於未處理樣品之 90%。
	10.其他成品農藥	加速貯藏試驗法 (CIPAC MT 46.3), 於 54 ± 2 °C 放置 14 日。	有效成分含量不低於未處理樣品之 95%。
	耐冷試驗	1.常溫下為液態, 有效成分溶解於水或有機溶劑形成溶液, 如溶液 (SL)、乳劑 (EC)、水分散性乳劑	0 °C 安定性測試法 (CIPAC MT 39)

	(DC)、油溶性液劑 (OL)、種子處理液劑 (LS)、超低容量液劑 (UL)等劑型成品農藥		
	2. 礦物油 (petroleum oil) 乳劑	礦物油耐冷試驗法 (CNS 2914), -5 ± 2 °C 放置 48 小時。	應為不分層之澄清油狀液體。
		礦物油冷稀釋液安定性測試法 (CIPAC MT 51), 1% (v/v) 稀釋於 0~2 °C 冰水, 室溫靜置 2 小時	水面不得有明顯油狀物

備註：

- 一、微生物製劑免安定試驗。
- 二、聚乙醛 6% 餌劑，以澱粉糊化造粒之耐水型產品，免耐熱試驗。
- 三、陶斯松之固態劑型（如粉狀、粒狀及片狀劑型）、免得爛 80% 水分散性粒劑、好達勝及磷化鎂等產生磷之成品農藥，得免耐熱試驗。
- 四、抽樣檢驗免耐熱試驗。